

STANDING ORDER FOR PPH BANNA HOSPITAL

Progress Note	Date time	Order for one day	Date time	Order for continuation
		<input type="checkbox"/> Add Oxyocin 10 IU ใน IV fluid เมื่อย้ายมารดาเข้าห้องคลอด ปรับตาม Contraction <input type="checkbox"/> ภายใน 1นาที่ หลังคลอดให้ Oxytocin 10IU IM <input type="checkbox"/> Methergine 0.2mg IM หลังรกคลอด ในกรณีไม่มีข้อห้าม <u>กรณีภาวะตกเลือดหลังคลอด</u> Standing order <input type="checkbox"/> CBC , plt <input type="checkbox"/> G/M PRC 2 - 4 Unit <input type="checkbox"/> 0.9 % NSS 1000 cc IV Loading <input type="checkbox"/> Uterine massage *First line treatment <input type="checkbox"/> Oxytocin 10 unit เข้ากล้ามเนื้อ <input type="checkbox"/> Oxytocin ขนาด 20-40 ยูนิต ในสารน้ำ 1000 ml โดยให้ 60 drop/min <input type="checkbox"/> ถ้าเลือดหยุดแล้ว ให้ Oxytocin ขนาด 20 ยูนิต ใน 5% D/N/2 1000 ml IV 40 drop/min *Second line treatment <input type="checkbox"/> Methergine 0.2 mg IM / IV ให้ซ้ำได้ทุก 15 นาที แต่ไม่เกิน 1 mg (หรือ 5 dose) *Third line treatment <input type="checkbox"/> Cytotec 4 tab (1-4 เม็ด) <input type="checkbox"/> oral <input type="checkbox"/> Sublingual <input type="checkbox"/> rectum <input type="checkbox"/> ถ้าเลือดไม่หยุดหลังการรักษาภายใน 30 นาที ประสานส่งต่อแบบ Fast tract <input type="checkbox"/> การรักษาอื่นๆ.....		
Name of Patient	Age	H.N.	A.N.	
Deparment of Service	Ward/Bed	Attending Physician		