




# แนวทางการวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกัน กรณีผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)



- \* Admit ห้องแยกโรคเดี่ยว หรือ ส่งต่อผู้ป่วยไป โรงพยาบาลนครนายก
- \* บุคลากรสวม PPE ตามความเหมาะสม\*
- \* ถ่ายภาพรังสีปอด (Film chest)
- \* ตรวจสอบห้องปฏิบัติการพื้นฐาน พิจารณาตามความเหมาะสม (ไม่จำเป็นต้อง Designated receiving area ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ)

## การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ

1. กรณีผู้ป่วยไม่มีอาการปอดอักเสบ เก็บ Nasopharyngeal swab ส่ง รพ.สระบุรี
2. กรณีผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบ
  - 2.1 กรณีไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ
    - เก็บเสมหะใส่ในภาชนะปลอดเชื้อ (Sterile container) จำนวน 1 ชุด
    - เด็กอายุ < 5 ปี หรือผู้ไม่สามารถเก็บเสมหะได้ ให้เด็ก Nasopharyngeal swab หรือ Suction ใส่ภาชนะปลอดเชื้อ (Sterile Container) จำนวน 1ชุด
  - 2.2 กรณีใส่ท่อช่วยหายใจ
    - เก็บ Tracheal suction ใส่ภาชนะปลอดเชื้อ (Sterile container) จำนวน 1 ชุด
    - รักษาตามอาการ

## หมายเหตุ

### \*\*กรณีในเวลา\*\*

1. ผู้ป่วยไปที่ศาลาหกเหลี่ยม
2. ห้องบัตรหน้า ER : জন.พ.ผู้ป่วยไปจุดตรวจไข้หวัดมกกฎ / พนักงานแปล พ.ผู้ป่วยไปศาลาหกเหลี่ยม (กรณีจนท.ห้องบัตรมีภาระงานยุ่งยาก)

### \*\*กรณีนอกเวลา\*\*

- \* แก้วสีเขียว สำหรับรอตรวจเสี่ยง Covid
- พยาบาลคัดแยกซักประวัติ แพทย์ตรวจรับยาห้องยา (แปล NA)

ปรับปรุง 18 พฤศจิกายน 2564