



โรงพยาบาลบ้านนา
(BANNA HOSPITAL)

CPG : PROM	ผู้จัดทำ : นางสาวสรिता นิธิประดิษฐกุล
รหัส CPG - PCT - 023	แก้ไขครั้งที่ 04 : วันที่บังคับใช้ วันที่ 25/02/65 หน้าที่ 1 / 1

แนวทางการดูแล หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนด

ภาวะน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนด (PREMATURE RUPTURE OF MEMBRANES) หมายถึงการที่มีถุงน้ำคร่ำแตก หรือรั่ว ก่อนจะมีอาการเจ็บครรภ์ โดยไม่จำกัดอายุครรภ์ แบ่งออกดังนี้
 Preterm PPRM อายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์
 Term PROM อายุครรภ์มากกว่า 37 สัปดาห์

ซักประวัติ ยืนยันอายุครรภ์
 ประวัติเรื่อง น้ำคร่ำรั่วซึม Urine dipstide For pH
 Speculum Exam ส่ง Fern test
 USG For DVP / AFI

มีน้ำเดินหรือไม่ no → ANC ต่อ

ADMIT
 Observer NST น้ำเดิน

ระวัง สายสะดือย้อย , น้ำคร่ำน้อย ,
 สายสะดือถูกกดขณะมดลูกหดตัว ,
 รกลอกตัวก่อนกำหนด , หรือมีการติดเชื้อตามมาได้

GA > 37 wks

yes →
 1. พิจารณา Induction of Labour c Oxtocin
 2. เมื่อน้ำเดินครบ 18 ชม.ให้
 - Ampicillin 2 gm iv stat then 1 gm ทุก 6 ชม.

no →
 ระวัง Infection

- Stat Ampicillin 2 gm iv then 1 gm ทุก 6 ชม.
 - V/S q 6 hr , FHS q 1 hr
 - ตรวจ BUN , Cr
 - Septic work CBC, UA ,urine culture ,cervical swab stain
 - Conservative Rx จนถึง 37 weeks
 - พิจารณา Refer ถ้า no progress

มีไข้ Show infection ?
 Chorio amnionitis ? → Refer

ผู้จัดทำ	ผู้รับรอง	ผู้อนุมัติ
สรिता (นางสาวสรिता นิธิประดิษฐกุล) นายแพทย์ชำนาญการ	 (นายฐาปกรณ์ พรประภาศักดิ์) องค์กรแพทย์	 (นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา