


แบบประเมินอาการติดแอลกอฮอล์ (ALCOHOL WITHDRAWAL SCALE)

ชื่อ-นามสกุล.....HN..... วันที่.....

TEM 1: Perspiration(เหงื่อ)	TEM2: Tremor (สั่น)	TEM3: Anxiety(วิตกกังวล)	TEM4: Agitation(กระสับกระส่าย)
0. ไม่มีเหงื่อ 1. ชื้นเฉพาะที่มือ 2. ฝ่ามือชื้นและมีเหงื่อเฉพาะตามใบหน้าและตามตัว 3. เหงื่อเปียกชื้นทั้งตัว 4. เหงื่อออกอย่างมากจนเสื้อผ้าเปียก	0. ไม่มีอาการสั่น 1. มีอาการสั่นเฉพาะเวลาขึ้นมือไปจับ สิ่งของ หรือถือของ 2. มีมือสั่นเล็กน้อยตลอดเวลา 3. มีมือสั่นอย่างมากตลอดเวลา	0. สงบ ไม่มีอาการวิตกกังวล 1. รู้สึกไม่สบายใจ 2. รู้สึกหวาดหวั่น ตกใจง่าย 3. วิตกกังวล กลัว สงบได้ยาก 4. ไม่สามารถควบคุมอาการ วิตกกังวล ได้รวมถึง Panic attacks	0. ปกติ ไม่มีอาการกระสับ กระส่าย 1. ง่วงนอน อยู่ไม่นิ่ง 2. กระวนกระวายไม่สามารถ นอน พักนิ่งๆ ได้ 3. กระสับกระส่าย เปลี่ยนท่า บ่อยเดินไปมา สามารถ นั่งพักหรือนอนพักได้ช่วง สั้นๆ 4. กระสับกระส่ายอย่างมาก ไม่สามารถอยู่นิ่งได้เลย เดินไปมาตลอดเวลา
TEM 5: Axilla Temperature	ITEM 6: Hallucination	ITEM 7: Orientation	รวมคะแนน 
0. อุณหภูมิ 37°C หรือน้อยกว่า 1. อุณหภูมิ 37.1°C ถึง 37.5 2. อุณหภูมิ 37.6°C ถึง 38.0 3. อุณหภูมิ 38.1°C ถึง 38.5 4. อุณหภูมิ 38.6°C หรือมากกว่า	0. ไม่มีประสาทหลอนเลย 1. มีอาการเห็นสิ่งของรอบข้าง บิดเบือน ไปเป็นพักๆ ยังรู้ว่าไม่ได้เกิดขึ้นจริง 2. มีประสาทหลอนชัดเจนเกิดขึ้นเฉพาะ ของบางสิ่งหรือบางเหตุการณ์ และเกิดขึ้นช่วงสั้นๆ ยังคงรับรู้ความเป็นจริงอยู่ 3. มีประสาทหลอนชัดเจนเหมือนข้อ 2 แต่ไม่เชื่อว่าไม่ใช่เรื่องจริง ยกที่จะให้ยอมรับได้ ว่าเป็นประสาทหลอนนั้น รู้สึกทุกข์ทรมานกับอาการประสาท หลอนนั้น และยังรับรู้ความเป็นจริง เฉพาะบางเรื่อง 4. มีประสาทหลอนชัดเจนในหลายเรื่อง ไม่สามารถรับรู้ความเป็นจริงได้ ผู้ป่วยเหมือนอยู่ในโลกของประสาทหลอน	0. รับรู้ บุคคล วัน เวลา สถานที่ ได้ดี 1. รับรู้ บุคคลและสถานที่ ได้ดีแต่มีปัญหาเรื่องวันเวลา 2. รับรู้บุคคล ได้ดี แต่มีปัญหา การรับรู้สถานที่และวันเวลา เป็นบางครั้ง 3. มีปัญหาการรับรู้บุคคลบางครั้ง แต่การรับรู้สถานที่และวันเวลาเสียไป 4. เสียการรับรู้บุคคลสถานที่ วัน เวลา ไม่ทราบว่าตัวเอง อยู่ที่ไหน อยู่กับใคร และไม่รู้ว่าวันเวลา	
ความรุนแรง	คะแนน	การให้ยา	
Mild	1-4	ไม่จำเป็นต้องให้ยา	
Moderate	5-9	ให้ยาช่วยลดโอกาสเกิดอาการขาดสุราที่รุนแรง	
Severe	10,14	ต้องได้รับการรักษาด้วยยาและติดตามอาการอย่างใกล้ชิด	
Very Sever	≥ 15	ต้องได้รับการรักษาด้วยยาขนาดสูงเพื่อทำให้อาการสงบอย่างรวดเร็ว	

