



# โรงพยาบาลบ้านนา (BANNA HOSPITAL)

CPG : ACS

ผู้จัดทำ : นายสุรภัทร คงสวัสดิ์

รหัส CPG – PCT – 002


แก้ไขครั้งที่ : 09 วันที่บังคับใช้ วันที่ 18/04/66

หน้าที่ 1/ 1

## แนวทางการดูแลและส่งต่อผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

1. เจ็บครั้งแรก, เจ็บบริเวณหน้าอก โดยเฉพาะผู้ชายอายุ  $\geq 45$  ปีหรือผู้หญิง  $\geq 55$  ปี และไม่สัมพันธ์กับ Trauma
2. เจ็บแน่นๆเหมือนมีอะไรมาทับหน้าอก หรือเจ็บบริเวณลิ้นปี่รุนแรง อาจร้าวไปไหล่ , แขน , ใต้คาง และสะบัก
3. อาการเจ็บหน้าอกที่มีสัญญาณชีพเปลี่ยนแปลง v/s ไม่ stable , O2 sat drop , ตัววาม , หอบเหนื่อย
4. Atypical chest pain เช่น จุกลิ้นปี่ , เจ็บหน้าอกตื้อๆไม่มีร้าวไปไหน , เวียนศีรษะ , ใจสั่น และมี Cardiovascular risk factor ร่วมด้วย ( HT, DM , Dyslipidemia , สูบบุหรี่อายุ  $> 35$  ปี และประวัติครอบครัวเป็น Coronary artery disease ผู้ชาย  $\geq 55$  ปี หญิง  $\geq 65$  ปี)

\*\*\*\* ถ้ามีอาการดังกล่าวข้อใดข้อหนึ่ง ให้ส่ง ER \*\*\*\*



### หมายเหตุ

1. กรณี Inferior wall MI (ST elevate in II , III , AVF ให้ทำ V3R , V4R)
2. กรณีมี ST depression in V1-V3 ให้ทำ V7-V9 เพื่อดู Posterior MI

ผู้จัดทำ	ผู้รับรอง	ผู้อนุมัติ
 (นายสุรภัทร คงสวัสดิ์) นายแพทย์ปฏิบัติการ	 (นายฉัตรชัย จิตรณรงค์ชัย) อายุรแพทย์	 (นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา